



FORTBILDUNGSPUNKTE

Lösungsbogen AG/116/2

CME-Modul:

Arzneimittelinteraktionen in der Schmerztherapie

CME-Punkte:

2

Zielgruppe:

Ärzte

Kursdauer bis:

03. Februar 2018

Link zur Anmeldung:

<http://cme.medlearning.de/cme-aktuelle-fortbildung.htm>

Unsere Lösungsbögen dienen zur Prüfungsvorbereitung und sollten nicht während der Online-Prüfung verwendet werden. Somit wird sichergestellt, dass Sie auch tatsächlich über das geforderte Wissen verfügen. Und denken Sie daran, kein Mensch ist fehlerfrei und braucht auch zur Beantwortung von Online-Fragen ausreichend Zeit. Nehmen Sie sich diese.

Frage: **Welche Aussage ist richtig?**

Antwort: **Bei ultraschnellen CYP2D6-Metabolisierern kommt das CYP2D6-Gen doppelt oder mehrfach vor.**

Frage: **Ihr Patient erhält Duloxetin gegen seine depressiven Verstimmungen aufgrund seiner starken Schmerzen. Welches Szenario ist denkbar?**

Antwort: **Der Patient fängt zu rauchen an, der Duloxetin-Plasmaspiegel reicht nicht mehr aus, die depressive Verstimmung wird wieder stärker.**

Frage: **Ein Patient klagt über den zunehmenden Wirkungsverlust seines seit längerem verschriebenen Fentanyl-Pflasters. Als Grund vermuten Sie eine Arzneimittelinteraktion mit:**

Antwort: **Rifampicin**

Frage: **Welche Aussage trifft nicht zu?**

Antwort: **Chinidin induziert CYP2D6**

Frage: **Das Kombinationspräparat Tilidin/Naloxon ist nicht sinnvoll bei:**

Antwort: **Leberinsuffizienten Patienten**

Frage: **Welcher der folgenden Wirkstoffe beeinträchtigt nicht die Bioverfügbarkeit von Duloxetin?**

Antwort: **Risperidon**

Frage: **Welches Medikament erhöht die ZNS-Konzentration von Morphin und damit die Gefahr einer Atemdepression?**

Antwort: **Chinidin**

Frage: **Ein mit einem ACE-Hemmer eingestellter Patient wird von Ihnen wegen seiner Rückenschmerzen kurzfristig mit hochdosiertem Ibuprofen behandelt. Auf welche unerwünschte Nebenwirkung müssen Sie achten bzw. sollten Sie den Patienten aufmerksam machen?**

Antwort: **Blutdruckanstieg**

Frage: **Welches der folgenden Opioide ist am besten geeignet für einen Patienten, der außerdem eine antiretrovirale Therapie mit Ritonavir erhält?**

Antwort: **Morphin**

Frage: **Ein mit Tramadol behandelter Patient eröffnet Ihnen, dass er seit Kurzem von seinem Psychiater Fluoxetin verschrieben bekommt. Mit welcher unerwünschten Nebenwirkung müssen Sie rechnen?**

Antwort: **Serotonin-Syndrom**



Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Prüfung.

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular auf unserer Homepage.