



FORTBILDUNGSPUNKTE ●●●

Lösungsbogen AG/147/2

CME-Modul:

Aktuelle topische Therapie der papulo-pustulösen Akne

CME-Punkte:

2

Zielgruppe:

Ärzte

Kursdauer bis:

27. Juli 2018

Link zur Anmeldung:

http://cme.medlearning.de/galderma/akne_therapie/index.htm



Unsere Lösungsbögen dienen zur Prüfungsvorbereitung und sollten nicht während der Online-Prüfung verwendet werden. Somit wird sichergestellt, dass Sie auch tatsächlich über das geforderte Wissen verfügen. Und denken Sie daran, kein Mensch ist fehlerfrei und braucht auch zur Beantwortung von Online-Fragen ausreichend Zeit. Nehmen Sie sich diese.



Frage: **Wie viel Prozent aller Jugendlichen weltweit leiden abhängig von der methodischen Erhebung und dem Alter an der Akne?**

a. Etwa 30-40%, b. Etwa 45-50%, c. Etwa 55-65%, d. etwa 70-95%

Antwort: **Nur Antwort d ist richtig = d. etwa 70-95%**

Frage: **Welche der folgenden Aussagen zur Pathogenese der Akne ist falsch?**

Antwort: **Frühe entzündliche Prozesse in der Haut spielen bei der Entstehung der Akne-Läsionen keine Rolle.**

Frage: **Welche Substanz oder Substanzgruppe wird generell für die topische Monotherapie der Akne nicht empfohlen?**

Antwort: **Antibiotika**

Frage: **Welche Aussage zur systemischen Akne-Therapie ist richtig?**

Antwort: **Wenn bei einer mittelschweren Akne größere Flächen im Stammbereich betroffen sind, soll eine systemische Therapie erwogen werden.**

Frage: **Was ist zur Reinigung und Pflege der Haut bei Patienten mit Akne nicht angezeigt?**

Antwort: **Alkalische Seife.**

Frage: **Was ist kein Risikofaktor für die Narbenbildung bei Akne?**

a. Familienanamnese (Genetische Faktoren), b. Früher Beginn der Akne, c. Ausbreitung und Dauer der Entzündung, d. Zeitfenster zwischen dem Beginn und einer wirksamen Therapie der Akne

Antwort: **Alle genannten Faktoren erhöhen das Risiko für die Narbenbildung bei Akne = a. Familienanamnese (Genetische Faktoren), b. Früher Beginn der Akne, c. Ausbreitung und Dauer der Entzündung, d. Zeitfenster zwischen dem Beginn und einer wirksamen Therapie der Akne.**

Frage: **Atrophe Narben können durch verschiedene Methoden verbessert werden. Welche der folgenden ist weniger gut geeignet?**

Antwort: **Korticoïdunterspritzung**

Frage: **Welche Wachstumsfaktoren und Rezeptoren sind bei der Pathogenese der Akne beteiligt?**

a. IGF-1, b. DHEA-S, c. IL-1 alpha, d. TLR-2


Antwort: **Alle Aussagen a bis d sind richtig = a. IGF-1, b. DHEA-S, c. IL-1 alpha, d. TLR-2**

Frage: **Welche Erhaltungstherapie ist nach einer systemischen Akne-Therapie angezeigt?**

Antwort: **Topische Retinoide oder Azelainsäure sind zur Erhaltungstherapie die erste Wahl.**

Frage: **Wie hoch ist die mittlere Reduktion der entzündlichen Läsionen nach 12 Wochen mit einer topischen Therapie mit 0,3% Adapalen/2,5% BPO, die in einer klinischen Studie bei Patienten mit schwerer papulo-pustulöser Akne dokumentiert wurde?**

Antwort: **74,4%**



Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Prüfung.

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular auf unserer Homepage.