CME-Modul:

Bakterielle Resistenzmechanismen - Grundlagen

CME-Punkte: Zielgruppe: Kursdauer bis:
4 Ärzte 16. Juli 2020

Link zur Anmeldung:

http://cme.medlearning.de/pfizer/bakterielle_resistenz_rez/index.htm

Unsere Lösungsbögen dienen zur Prüfungsvorbereitung und sollten nicht während der Online-Prüfung verwendet werden. Somit wird sichergestellt, dass Sie auch tatsächlich über das geforderte Wissen verfügen. Und denken Sie daran, kein Mensch ist fehlerfrei und braucht auch zur Beantwortung von Online-Fragen ausreichend Zeit. Nehmen Sie sich diese.

Frage: Welche Resistenzform kommt nur bei gramnegativen Erregern

Antwort: Extended-Spectrum-Beta-Lactamasen (ESBL)

Frage: Wofür steht PBP und welche Bedeutung haben PBP im Zusammenhang mit

Antibiotika?

Antwort: PBP = Penicillin-Binde-Proteine. PBP sind verantwortlich für die bakterielle

Peptidoglycansynthese und die Zielenzyme von Beta-Lactam-Antibiotika

Frage: Welcher Resistenzmechanismus ist für die Ausbildung einer Methicillin-Resistenz

bei Staphylococcus aureus verantwortlich?

Antwort: Das MRSA Resistenzgen mecA, codiert für ein modifiziertes Penicillin-Bindeprotein

(PBP2a, syn. PBB2).

Frage: Welche Beta-Lactamasen mit hohem Bedrohungspotenzial nach CDC (serious

threat) gehören mittlerweile zum klinischen Alltag?

Antwort: Extended-Spectrum-Beta-Lactamasen (ESBL)

Frage: Wann spricht man von Multiresistenz (MDR) nach RKI-Definition?

Antwort: Die Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) für den stationären Bereich erfassen

Multiresistenz bei den gramnegativen Erregern (MRGN) nur, wenn gegenüber

mindestens 3 Antibiotikaklassen eine Resistenz vorliegt.

Frage: Was versteht man unter bakteriellen "Effluxpumpen"?

Antwort: Effluxpumpen sind spezielle bakterielle Transportproteine (Membran-ATPasen), die

das Antibiotikum aktiv aus der Bakterienzelle herauspumpen.

Frage: Welche unterschiedlichen bakteriellen Resistenzmechanismen gibt es?

Antwort: Effluxpumpen, Beta-Lactamasen wie ESBL, Permeationsresistenz,

PBPVeränderungen, Änderung der ribosomalen Zielstruktur

Frage: Welche gramnegativen Bakterien gelten heute als Erreger mit höchster

Bedrohungsstufe nach CDC (urgent threat)?

Antwort: Carbapenemase-bildende Enterobacteriaceae

Frage: Wie viele nosokomiale Infektionen gibt es schätzungsweise pro Jahr in Deutschland

und wie viele davon sind durch multiresistente Erreger (MRE) bedingt?

Antwort: In Deutschland gibt es pro Jahr etwa 400 000-600 000 nosokomiale Infektionen,

davon sind ca. 30 000-35 000 durch MRE verursacht.

Frage: Welche Erreger sind in der Lage, eine Vielfalt an unterschiedlichen Beta-

Lactamasen zu produzieren, einschließlich ESBLs und Carbapenemasen?

Antwort: Enterobacteriaceae wie Klebsiella pneumoniae sowie die Nonfermenter

Pseudomonas aeruginosa und Acinetobacter baumannii

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Prüfung.

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular auf unserer Homepage.