



# FORTBILDUNGSPUNKTE

Lösungsbogen AG/202/4

CME-Modul:

**Kontrazeption mit Levonorgestrel-haltigen Intrauterinsystemen**

CME-Punkte:

**4**

Zielgruppe:

**Ärzte**

Kursdauer bis:

**02. September 2019**

Link zur Anmeldung:

[https://cme.medlearning.de/jenapharm/lng\\_ius/index.htm](https://cme.medlearning.de/jenapharm/lng_ius/index.htm)

Unsere Lösungsbögen dienen zur Prüfungsvorbereitung und sollten nicht während der Online-Prüfung verwendet werden. Somit wird sichergestellt, dass Sie auch tatsächlich über das geforderte Wissen verfügen. Und denken Sie daran, kein Mensch ist fehlerfrei und braucht auch zur Beantwortung von Online-Fragen ausreichend Zeit. Nehmen Sie sich diese.

Frage: **Welche Aussage zur Insertion von LNG-IUS ist falsch?**

Antwort: **Die Fäden des LNG-IUS sollten auf eine Länge von maximal 1 bis 2 cm außerhalb der Zervix gekürzt werden.**

Frage: **Welche der folgenden Aussagen zur kontrazeptiven Situation in Deutschland ist falsch?**

Antwort: **15 % der Frauen verhüten mittels LNG-IUS.**

Frage: **Welche Aussage zum Wirkmechanismus und der Verhütungssicherheit der drei LNG-IUS ist richtig?**

Antwort: **Die kontinuierliche Freisetzung von Levonorgestrel in die Uterushöhle bewirkt eine Veränderung der Kapazität und der Motilität der Spermien sowie eine Endometrium-Suppression im Uterus.**

Frage: **Welche Aussage bezüglich des Blutungsmusters unter LNG-IUS ist falsch?**

Antwort: **Amenorrhöen treten insbesondere in den ersten drei Anwendungsmonaten auf und werden gegen Ende der Liegedauer seltener beobachtet.**

Frage: **Welche Aussage zur Insertion von LNG-IUS ist richtig?**

Antwort: **Optimal ist die Insertion eines LNG-IUS am 2. oder 3. Tag der Menstruationsblutung.**

Frage: **Welche Aussage bezüglich Expulsionen und Perforationen unter LNG-IUS ist falsch?**

Antwort: **Das Risiko einer Expulsion steigt nach dem 1. Anwendungsjahr bis zum Ende der Liegedauer kontinuierlich an.**

Frage: **Welche der folgenden Aussagen bezüglich der Eigenschaften der drei auf dem Markt verfügbaren LNG-IUS ist falsch?**

Antwort: **Alle drei LNG-IUS verfügen über einen Silberring zur besseren Darstellung im Ultraschall.**

Frage: **Welche der folgenden Aussagen ist richtig?**

**Die Extrauteringraviditäten-Rate unter LNG-IUS (pro 100 Frauenjahre) liegt bei...**

Antwort: **0,02 bis 0,2**

Frage: **Welche Aussage zum Problemmanagement ist richtig?**

Antwort: **Innerhalb der ersten sechs Monate nach LNG-IUS-Insertion ist bei initialen Zwischenblutungen in der Regel keine Therapie erforderlich.**

Frage: **Wie viele KOK-Anwenderinnen wünschen sich nach Umfragen im Rahmen der TANCO-Studie mehr Aufklärung über LARC (reversible Langzeitkontrazeption)?**

Antwort: **57%**

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Prüfung.**

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular auf unserer Homepage.