



# FORTBILDUNGSPUNKTE

## Lösungsbogen AG/218/4

CME-Modul:

**Pertussis - Eine unterschätzte Erkrankung**

CME-Punkte:

**4**

Zielgruppe:

**Ärzte**

Kursdauer bis:

**29. November 2020**

Link zur Anmeldung:

[https://cme.medlearning.de/sanofi-aventis/pertussis\\_impfung\\_rez1/index.htm](https://cme.medlearning.de/sanofi-aventis/pertussis_impfung_rez1/index.htm)

Unsere Lösungsbögen dienen zur Prüfungsvorbereitung und sollten nicht während der Online-Prüfung verwendet werden. Somit wird sichergestellt, dass Sie auch tatsächlich über das geforderte Wissen verfügen. Und denken Sie daran, kein Mensch ist fehlerfrei und braucht auch zur Beantwortung von Online-Fragen ausreichend Zeit. Nehmen Sie sich diese.

Frage: **Welche labordiagnostische Maßnahme ist in den ersten zwei bis drei Wochen nach Einsetzen der Hustensymptomatik das Mittel der Wahl?**

Antwort: **Tiefer Nasopharyngealabstrich**

Frage: **Wie lang dauert das Stadium convulsivum bei Erstinfektion eines Ungeimpften ungefähr an?**

Antwort: **Vier bis sechs Wochen**

Frage: **Wie viel Prozent der aufgrund von Pertussis hospitalisierten Säuglinge leiden an Apnoen?**

Antwort: **33 %**

Frage: **Welche Aussage zur Pertussis-Impfung ist falsch?**

Antwort: **Im Zeitraum 2007–2016 lag die bundesweite 10-Jahres-Impfquote gegen Pertussis bei 70 %.**

Frage: **Welche Aussage zu den verfügbaren Pertussis-Impfstoffen ist falsch?**

Antwort: **Die gleichbleibende Impfschutzdauer für azelluläre Pertussis-Impfstoffe wird mit etwa 20 Jahren angegeben.**

Frage: **Durch wen werden Säuglinge hauptsächlich mit Pertussis-Erregern angesteckt?**

Antwort: **Durch die Eltern**

Frage: **Welche Aussage zu Bordetella (B.) pertussis ist falsch?**

Antwort: **B. pertussis kann bei Menschen und Schafen vorkommen.**

Frage: **Wie hoch war die Pertussis-Inzidenz bei Säuglingen im Jahr 2018?**

Antwort: **46 Erkrankungen/100.000 Einwohner**

Frage: **Welche Aussage zur Therapie von Pertussis-Erkrankungen ist richtig?**

Antwort: **Säuglinge sollten stationär aufgenommen werden, um insbesondere das Auftreten von Apnoen zu überwachen.**

Frage: **Wann sollte die Grundimmunisierung gegen Pertussis von Säuglingen und Kleinkindern möglichst beginnen?**

Antwort: **Unmittelbar nach Vollendung des zweiten Lebensmonats**



**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Prüfung.**

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular auf unserer Homepage.