



FORTBILDUNGSPUNKTE ●●●

Lösungsbogen AG/225/4

CME-Modul:

Diagnose und Therapie der PAH bei systemischer Sklerose

CME-Punkte:

4

Zielgruppe:

Ärzte

Kursdauer bis:

17. Februar 2021

Link zur Anmeldung:

<https://www.cme-kurs.de/kurse/diagnose-und-therapie-der-pah-bei-systemischer-sklerose/>

Unsere Lösungsbögen dienen zur Prüfungsvorbereitung und sollten nicht während der Online-Prüfung verwendet werden. Somit wird sichergestellt, dass Sie auch tatsächlich über das geforderte Wissen verfügen. Und denken Sie daran, kein Mensch ist fehlerfrei und braucht auch zur Beantwortung von Online-Fragen ausreichend Zeit. Nehmen Sie sich diese.

Frage: **Welche Aussage zur systemischen Sklerose (SSc) ist falsch?**

Antwort: **Etwa ein Viertel aller Organmanifestationen tritt in den ersten beiden Jahren nach Einsetzen der Raynaud-Symptomatik auf.**

Frage: **Welche Aussage zur pulmonal arteriellen Hypertonie (PAH) bei SSc ist richtig?**

Antwort: **Die PAH gehört zu den häufigsten Todesursachen bei SSc.**

Frage: **Welche Aussage zur Prognose bei SSc ist falsch?**

Antwort: **Die mediane 3-Jahres-Überlebensrate bei Patienten mit SSc-PAH beträgt 76 %.**

Frage: **Welche Aussage zum Zeitpunkt der PAH-Diagnosestellung bei SSc ist richtig?**

Antwort: **Etwa 80 bis 90 % der Patienten befinden sich zur Diagnose in den Funktionsklassen III oder IV.**

Frage: **Welche Aussage zu PH und PAH bei SSc ist falsch?**

Antwort: **Bei Progress der PAH treten meistens typische Symptome einer manifesten Linksherzinsuffizienz auf.**

Frage: **Welche Aussage zur Klassifikation und Definition der PAH bei SSc ist richtig?**

Antwort: **Zur Stellung der PAH-Diagnose müssen andere Ursachen einer präkapillären PH, einschließlich PH infolge von Lungenerkrankungen, CTEPH oder andere Erkrankungen ausgeschlossen werden.**

Frage: **Welche Aussage zur Risikostratifizierung ist richtig?**

Antwort: **Das Konzept der Risikostratifikation dient als Grundlage für das therapeutische Vorgehen und für die prognostische Einschätzung.**

Frage: **Welche Aussage zur Diagnostik der PAH bei SSc ist falsch?**

Antwort: **Neben dem klinischen Verdacht erfordert die Diagnose einer PAH die Durchführung verschiedener gezielter Untersuchungen; ein Abdomen-Ultraschall gehört nicht dazu.**

Frage: **Welche der folgenden Maßnahmen gehört zu den allgemeinen Maßnahmen und supportiven Therapien bei SSc-PAH?**

Antwort: **Vermeidung körperlicher Aktivität, die zu Überanstrengung und Verstärkung der Symptome führt.**

Frage: **Welche Aussage zum DETECT-Algorithmus ist falsch?**

Antwort: **Behandlungsnaive „typische“ Patienten mit hohem Risiko sollten sobald als möglich innerhalb von drei Monaten nach PAH-Diagnose mit einer subkutanen bzw. intravenösen Riociguat-Therapie behandelt werden.**

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Prüfung.

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular auf unserer Homepage.