



# FORTBILDUNGSPUNKTE

## Lösungsbogen AG/240/4

CME-Modul:

**Behandlung von Patienten mit Vorhofflimmern: Outcomeverbesserung durch frühzeitige Katheterbehandlung?**

CME-Punkte:

4

Zielgruppe:

Ärzte

Kursdauer bis:

21. Dezember 2022

Link zur Anmeldung:

<https://www.cme-kurs.de/kurse/patienten-mit-vhf-outcomeverbesserung-durch-katheterbehandlung/>

Unsere Lösungsbögen dienen zur Prüfungsvorbereitung und sollten nicht während der Online-Prüfung verwendet werden. Somit wird sichergestellt, dass Sie auch tatsächlich über das geforderte Wissen verfügen. Und denken Sie daran, kein Mensch ist fehlerfrei und braucht auch zur Beantwortung von Online-Fragen ausreichend Zeit. Nehmen Sie sich diese.

Frage: **Welche Aussage ist richtig? Ohne eine entsprechende Behandlung haben Patienten mit einem Vorhofflimmern ein erhöhtes Risiko für...**

Antwort: **Alle Aussagen sind richtig**

Frage: **Wo sind im Herzen die ein Vorhofflimmern auslösenden Triggerzellen lokalisiert?**

Antwort: **Im Mündungsbereich der Pulmonalvenen des linken Vorhofes**

Frage: **Wie lautet die Kurzbezeichnung für das neue integrierte VHF-Management in den 2020-ESC-Leitlinien im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes zur Behandlung des Vorhofflimmerns?**

Antwort: **CC to ABC**

Frage: **Welche Aussage zur Cryo-FIRST-Studie ist falsch?**

Antwort: **Bei den mit einem Kryoballonkatheter abladierten Patienten wurde zwölf Monate nach dem Eingriff eine signifikant schlechtere Lebensqualität im Vergleich zu den mit Antiarrhythmika behandelten Patienten dokumentiert.**

Frage: **Welche Terminologie zur Klassifizierung eines Vorhofflimmerns soll nach den neuen 2020-ESC-Leitlinien nicht mehr verwendet werden?**

Antwort: **Chronisches Vorhofflimmern**

Frage: **Welche Komponente oder welcher Parameter ist KEIN Bestandteil des neuen und in den 2020-ESC-Leitlinien vorgestellten 4S-AF-Schemas zur Charakterisierung des Vorhofflimmerns?**

Antwort: **Serendipität**

Frage: **Als Risikofaktor für die Entstehung eines Vorhofflimmerns und einer erhöhten Rezidivrate nach Behandlung des Vorhofflimmerns gilt?**

Antwort: **Alle Aussagen sind richtig**

Frage: **Wie lange sollen Patienten mit Vorhofflimmern im Anschluss an eine Ablation laut 2020-ESC-Leitlinien antikoaguliert werden?**

Antwort: **Für zwei Monate**

Frage: **Welche Aussage zum Stellenwert der Katheterablation in den neuen 2020-ESC-Leitlinien zur Behandlung des Vorhofflimmerns ist falsch?**

Antwort: **Eine Ablationsbehandlung darf nur nach einem Therapieversuch mit antiarrhythmisch wirksamen Medikamenten über mindestens vier Wochen oder nach einer Kardioversion durchgeführt werden.**

Frage: **Wie hoch wird die Erfolgsrate einer Ablation bei Patienten mit symptomatischem paroxysmalen Vorhofflimmern in einem spezialisierten Zentrum in Deutschland eingeschätzt?**

Antwort: **Etwa 80%**

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Prüfung.**

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular auf unserer Homepage.